

整形系列九

狐臭手術



嘉義基督教醫院
醫學美容中心

院址：嘉義市保健街100號(2樓)
電話：05-2765041轉8099
網址：www.cych.org.tw

一、狐臭從何來？

自青春期開始有大量的頂漿腺產生，它所排出的特殊汗液本身並無味道，但經皮膚細菌分解成二氧化硫及氨後，才散發出刺鼻的異味。有的人頂漿腺特別發達，味道也就特別濃，此多半與遺傳有關。

二、手術方式

1. 傳統手術方式：採局部麻醉，於腋下行頂漿腺切除術（大約在多毛區域之皮下），傷口於腋下約2~3公分，費時約2小時。
2. 微創手術方式：採局部麻醉，於腋下行頂漿腺括除術（大約在多毛區域之皮下），傷口於腋下約1公分，費時約1小時。

三、手術前注意事項

1. 手術採局部麻醉，故並無進食限制。
2. 填妥手術及麻醉同意書。
3. 手術當天請取下身上所有金屬物品，並將腋毛刮除乾淨。

4. 請準備好一件寬鬆的前扣式襯衫，一併帶入手術房。
5. 若有長期服用抗凝血藥物或女性病患正值生理期，請事先告知醫師。

四、手術後注意事項

1. 手術後於兩側腋下會以紗布包紮加壓固定，兩側上臂請盡量休息，勿作外展及舉高動作，如提重物、打球、打電腦、抱小孩…等，此需持續約一週，以防止傷口發生血腫情形，確保傷口順利復原。
2. 手術前後二週都需禁煙，否則腋下皮膚容易潰爛壞死。
3. 術後10~14天拆線，一個月內需定期回診檢查。

若您有相關疑問，歡迎來電，
本院醫學美容中心，將有專人為您
詳細解答。諮詢專線：05-2750505